

MR（麻疹・風疹混合）の予防接種を受けられた方へ

◎接種後の注意について

接種後30分位は安静にしてください。もしもその間に体調の異常を感じたら、医師又は看護師に申し出てください。

接種当日は、飲酒や激しい運動は避け、注射部位を清潔に保ってください。入浴は、差し支えありませんが、注射部位をこすることはやめましょう。

接種部位の発赤や疼痛がでたり、接種後7日～12日目くらいに発熱や麻疹様発疹の症状が出ることがあります。これらの症状がでたり、筋肉痛、頭痛、関節痛などの症状がでてきた場合は、医師の診察を受けるとともに仙台空港検疫所支所へご連絡ください。

接種後1ヶ月以内に医療機関を受診する際は、MR（麻疹・風疹混合）の予防接種を受けたことを医師に伝えてください。

MR（麻疹・風疹混合）の予防接種を受けてから27日以上の間隔を置かないと、他の予防接種を受けられません。

* 女性の方へ *

MR（麻疹・風疹混合）は弱毒生ウイルスのため、接種後2ヶ月間は妊娠を避けるようにしてください。



お問い合わせ
仙台空港検疫所支所
TEL：022-383-1854

ホームページ：

<https://www.forth.go.jp/keneki/sendai/>
〒989-2401

宮城県名取市下増田南原 仙台空港国際
線ターミナルビル M2 階